

Лечение с лингвални брекети при хиподонтия

Хиподонтията, когато е във фронталния участък се открива сравнително рано в периода на развитие на съзъбието. Много често това е времето на пуберитетният период, когато суетата надделява над търпението за едно по-дълго лечение и се предприемат протетични възстановявания на липсващите зъби без за тях да е осигурено достатъчно място, без да са нормализирани оклузалните съотношения, без да е преклусило цялостното развитие на лицево-челюстната област.


Представяме лечение на пациент, при който е направено протетично възстановяване в детска възраст на хиподонтия на двата долни резеца, без за тях да има достатъчно място. Поставеният мост е изработен с малки и дори ротирани резци и си хармонира с един струпан горен фронт. Оклузията в страничния участък, поради намаления размер на долна челюст е дистална.

Проведено е ортодонтско лечение с лингвална техника и позициониране на брекетите с дигитален Set-Up. Постигнато е място в долния фронтален сегмент за протетично възстановяване с нормален размер на резците. Чрез стрипинг техника и дистализиране при горни странични зъби се нормализира оклузията, подредени бяха зъбите в горна челюст. Повеќе на лечението на пациентът бе изработван временен мост, а след приключване на ортодонтското лечение той се свърза с колега протетик и извърши дефинитивното възстановяване.

Пациент с хиподонтия на долни централни резци, който е бил протезиран без за тях да е имало достатъчно място в зъбната дъга. Проблемът е усложнен от дълбока и дистална захапка. Пациентът изисква лечение с невидими апарати.



Set-Up на клиничний случай





Етапи от лечението

Проведе се лечение с лингвални брекети, целящо отваряне на място за долни резци, повдигане и медиализиране на захапката.





Начало



Отворено място
и временна
конструкция



Дефинитивно
завършване

Финал на ортодонтското и протетично лечение



Сравнение

